

BIOADVANCED®
SCIENCE-BASED SOLUTIONS

FRUIT & VEGETABLE 3-IN-1 SOLUTION

CONCENTRATE

**KILLS LISTED
INSECTS,
DISEASES
& MITES**

Use up to day
before harvest



00a 0071 **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**
CAUTION See back panel booklet for additional
precautionary statements

Active Ingredients:	
Sulfur	10.0%
Pyrethrins	0.25%
Other Ingredients	89.75%
Total	100.00%

NET CONTENTS
32 FL OZ (946ml)

Kills listed insects, diseases and mites.

CONTROLS



USE SITES



QUICK FACTS



MAKES UP TO 12.8 GALLONS OF SPRAY

READ THE LABEL FIRST
Indicaciones en español después de las de inglés

FOR USE ONLY ON RESIDENTIAL LAWNS AND GARDENS.
Not for use on agricultural establishments growing agricultural crops or commodities for resale.



¹Money back guarantee: if you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

EPA Reg. No. 67702-17-92564
EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.
(65) = 92564-TX-1 (68) = 67572-GA-1 (39) = 58996-MO-1
(57) = 071106-GA-003

PEEL
HERE

0da 00V1

DIRECTIONS FOR USE It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Shake well before using.

FOR CONTROL OF FUNGAL DISEASES

When *high levels of disease* are present, or during periods of *wet weather*, mix *5 fluid oz of product with 1 gallon of water* and shake well. During *drier weather* or when *low levels of disease* are present, mix *2.5 fluid oz product with 1 gallon of water* and shake well. Thoroughly spray all areas of the plant, especially new shoots. For best control apply as a protective spray early in the season before the diseases are noticed. Re-spray every 7 to 10 days or after rain. May be used up to day before harvest.

FOR CONTROL OF INSECTS/MITES

Dilute product by mixing *5 fluid oz product with 1 gallon of water*. Shake well. Thoroughly spray all areas of the plant, especially new shoots and the underside of leaves. Pests need to be contacted by the spray to be controlled.

PRECAUTIONS

- Some varieties of grapes and cucurbits are sensitive to sulfur and some plant damage may occur.
- Use care or do not spray on sulfur sensitive plants. If not sure, test spray a few leaves 2 days before spraying the entire plant.

RESTRICTIONS

- Do not apply directly to or near water. Drift and run-off may be hazardous to fish in water adjacent to treated areas.
- Do not use if temperatures are expected to be over 90°F.
- Do not apply to strawberry fruit that will be used for canning.
- Do not spray plants with this product within 21 days of an oil spray.
- Do not make applications during rain
- Do not apply this product in a way that will contact adults, children, or pets, either directly or through drift.
- Do not allow adults, children, or pets to enter the treated area until sprays have dried
- Do not wet plants to the point of runoff or drip
- Do not water the treated area to the point of runoff
- Not for use in outdoor residential misting systems

For use only on residential lawns and gardens. Not for use on agricultural establishments growing agricultural crops or commodities for resale.

USE SITES

For Use Indoor, Outdoor and in Greenhouses

FRUIT AND NUT TREES: Almond, Apple, Avocados, Cherry, Citrus, Oranges, Grapefruit, Lemon, Limes, Citron, Kumquat, Filbert, Nectarine, Peach, Pear, Pecans, Pistachios, Plum, Prune, Walnut

VEGETABLE AND VINE PLANTS: Beans, Beets, Blackberries, Blueberries, Broccoli, Brussel's Sprouts, Cabbage, Carrots, Cauliflower, Corn, Cucurbits (Cucumber, Melons, Pumpkins And Squash), Currant, Gooseberries, Grapes, Kale, Onions, Peas, Peppers, Potatoes, Raspberries, Radish, Strawberries, Tomatoes

ORNAMENTALS: Flowering Plants And Shrubs, Woody Ornamentals, Roses, Trees and Houseplants

FOR CONTROL OF FUNGAL DISEASES

Controls a wide range of fungal diseases including but not limited to: blackspot, powdery mildew, rust, scab, blight, brown rot and leaf spot. Thoroughly spray all areas of the plant, especially new shoots. For best control apply as a protective spray early in the season

FOR CONTROL OF FUNGAL DISEASES

before the diseases are noticed. Re-spray every 7 to 10 days or after rain. May be used up to day before harvest.

FOR CONTROL OF INSECTS/MITES

Controls a wide range of pests not limited to: Ants (excluding fire ants, harvester ants, Pharaoh's ants and carpenter ants), Aphids (including Green Peach Aphids), Armyworms, Bagworms, Beet Armyworm, Beetles (including Asparagus Beetle, Bean Beetles, Blister Beetles, Colorado Potato Beetles, 12-spotted Cucumber Beetles, Cucumber Beetles, Darkling Beetles (lesser mealworm), Saw-toothed Grain Beetles, Elm Leaf Beetles, Flea Beetles, Japanese Beetles, Mexican and Bean Beetles), Borers (including European Corn Borer, and Squash Vine Borer, but excluding Emerald ash borer and Asian long horn beetle), Cabbage Looper, Cabbageworms (including Cross-striped Cabbageworm and Imported Cabbageworm), Cankerworms, Caterpillars (including Eastern Tent Caterpillar, Forest Caterpillar and Tent Caterpillar), Crane Flies, Crickets, Diamondback Moth Larvae, Earwigs, Fireworms, Fungus Gnats, Fruit Flies, Glassy Winged Sharpshooter, Grape Leaf Skeletonizer, Green Fruit Worm, Harlequin Bug, Hornworms including Tomato Hornworm, Katydid, Lace Bugs, Leafhoppers (including Grape Leafhopper, and Potato Leafhoppers), Leafminers, Leaf-tiers, Loopers, Leafrollers (including Fruit-tree Leafrollers), Lygus, Maggots (including Apple Maggot and Onion Maggot), Mealy Bugs, non-biting Midges, Millipedes, Mites (including Spider Mites and Clover Mite), Moths (including Artichoke Plume Moth, Codling Moth, Diamondback Moth, European Pine Tip Moth, Gypsy Moth (adults and larvae), Indian Meal Moth and Mediterranean Flour Moth), Mushroom Flies, Navel Orangeworm, Pear Psylla, Plant Bugs, Psyllids, Roselugs, Scale, Silverfish, Skippers, Sowbugs, Spittlebugs, Squash Bugs, Stink Bugs, Tarnished Plant Bug, Thrips including Greenhouse Thrips, Vinegar Flies, Webworms, Weevils (including Boll Weevil, Carrot Weevil, Clover Weevil and Rice Weevil), Whiteflies.

Thoroughly spray all areas of the plant, especially new shoots and underside of leaves. Pests need to be contacted by the spray to be controlled

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE

Store at room temperature and protect from freezing.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING

Nonrefillable. Do not reuse or refill this container.

If Empty:

- Place in trash or offer for recycling if available.

If Partly Filled:

- Call your local solid waste agency for disposal instructions.
- Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

FIRST AID

IF IN EYES

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF ON SKIN OR CLOTHING

- Take off contaminated clothing.
- Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.

You may call toll-free (877) 229-3763 for medical emergency information.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION

- Causes moderate eye irritation.
- Avoid contact with eyes.
- Avoid contact with skin or clothing.
- Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is toxic to aquatic organisms, including fish and invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.

This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds while bees are actively visiting the treatment area.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Combustible. Do not use or store near heat or open flame.

INDICACIONES DE USO Constituye una violación a la ley federal usar este producto en una manera diferente a lo expuesto en esta etiqueta.

Agitar bien antes de usar.

PARA CONTROL DE ENFERMEADES MICÓTICAS

Cuando hay presente niveles alto de la enfermedad, o durante periodos de clima húmedo, mezclar 5 onzas líquidas del producto con 1 galón de agua y agitar bien. Durante clima más seco o cuando hay presente niveles bajos de la enfermedad, mezclar 2.5 onzas líquidas del producto con 1 galón de agua y agitar bien. Rociar bien todas las áreas de la planta, especialmente los brotes nuevos. Para un mejor control aplicar como rocío protector temprano en la temporada antes de que se observe la enfermedad. Volver a rociar cada 7 o 10 días o luego de una lluvia. Puede usarse hasta un día antes de la cosecha.

PARA CONTROL DE INSECTOS/ÁCAROS

Diluir el producto usando 5 onzas líquidas del producto con 1 galón de agua. Agitar bien. Rociar bien todas las áreas de la planta, especialmente los brotes nuevos y debajo de las hojas. Las plagas deben estar en contacto con el rocío para poder controlarlas.

PRECAUCIONES:

- Algunas variedades de uvas y cucurbitáceas son sensibles al sulfuro y puede ocurrir algún daño a la planta.
- Usar con cuidado o no rociar sulfuro sobre plantas sensibles. Si no está seguro, probar el rocío sobre unas pocas hojas 2 días antes de rociar la planta completa.

RESTRICCIONES

- No aplicar directamente o cerca del agua. Su dispersión o corriente puede ser peligroso para los peces en agua adyacente a áreas tratadas.
- No usar si se espera que la temperatura esté por encima de los 90°F.
- No aplicar a la frutilla que se usará para enlatar.
- No rociar plantas con este producto dentro de los 21 días de usar un rocío con aceite.
- No realizar aplicaciones si llueve.
- No aplicar este producto de modo que entre en contacto con adultos, niños o mascotas ya sea directamente o por goteo.
- No permitir que los adultos, los niños o las mascotas vuelvan a ingresar al área tratada hasta que el rocío se haya secado.
- No humedecer las plantas hasta el punto que goteen o que corra el agua sobre ellas.

RESTRICCIONES

- No regar el área tratada hasta el punto que corra el agua.
- No usar en sistemas tipo rocío fino residencial externo

Para usar solamente en jardines y patios residenciales. No usar en establecimientos agrícolas donde crecen cultivos o productos para la reventa.

LUGARES DE USO

Para uso en interiores, exteriores e invernaderos

NOGALES Y ÁRBOLES FRUTALES: almendra, manzana, aguacate, guinda, cítricos, naranja, pomelo, limón, lima, cidro, naranjo enano, avellana, nectarina, durazno, pera, pecán, pistacho, ciruela, ciruela pasa, nuez

VEGETALES Y PLANTAS DE VID: habas, remolacha, moras, arándanos, brócoli, brotes de Bruselas, repollo, zanahoria, coliflor, maíz, cucurbitáceas (pepino, melones, calabacín y zapallo de invierno), grosella, ribes uva crispera, uvas, kale, cebollas, chicharos, pimientos, papas, frambuesa, rábano, fresas, tomates

PLANTAS DECORATIVAS: plantas con flores y arbustos, plantas decorativas leñosas, rosas, árboles y plantas de interiores

PARA CONTROL DE ENFERMEDADES MICÓTICAS

Controla una amplia gama de enfermedades micóticas incluyendo entre otras: mancha negra, tizón polvoriento, roña, costra, tizón, pudrición y manchas en las hojas. Rocíar bien todas las áreas de la planta, especialmente los brotes nuevos. Para un mejor control aplicar como rocío protector temprano en la temporada antes de que se observe la enfermedad. Volver a rociar cada 7 o 10 días o luego de una lluvia. Puede usarse hasta el día de la cosecha.

PARA CONTROL DE INSECTOS/ÁCAROS

Controla una amplia gama de plagas no limitadas a: hormigas (quedan excluidas las hormigas de fuego, las hormigas cosechadoras, las hormigas faraonas y las hormigas carpinteras), áfidos (incluyendo los áfidos verdes del durazno), gusanos militares, gusano de hoja perenne, escarabajo militar, escarabajos (incluyendo el escarabajo del espárrago, el escarabajo de las habas, meloidae, escarabajo de la patata, escarabajo del pepino de 12 manchas, escarabajo del pepino, escarabajo negro (Tenebrionidae), escarabajo de grano con dientes de sierra, escarabajo del olmo, escarabajo japonés, escarabajo de las habas y mexicano), barrenadores (incluye el barrenador europeo del maíz, y barrenador de la guía de la calabaza pero queda excluido el barrenador esmeralda del fresno y el escarabajo asiático de cuernos largos), oruga de la col, gusanos de la col (incluyendo el gusano de la col de rayas cruzadas y la blanquita de la col), gusano del chancro de otoño, orugas (incluyendo la oruga de la carpa oriental, la oruga del bosque y la oruga de la carpa), moscas grulla, grillos, la palomilla dorso de diamante, tijeretas, gusanos del fuego, mosca del mantillo, mosca de la fruta, francotirador de alas vidriosas, gusano descarnador de la vid, gusano verde de la fruta, murgantia histriónica, gusanos de cuernos incluyendo gusano del tomate, saltamontes longicornios, chinches de encaje, saltamontes (incluyendo el saltamontes de la uva y el saltamontes de la patata), los minadores de hojas, orugas pegadoras, orugas, orugas enrolladoras de hojas (incluyendo el enrollador de hojas de frutas de árboles), lygus, gusanos (incluyendo el gusano de la manzana y el gusano de la cebolla), cochinillas harinosas, quironómidos, ciempiés, ácaros (incluyendo ácaros araña y ácaro del trébol), polillas (incluyendo polilla de la pluma de la alcachofa, polilla de la manzana, palomilla dorso de diamante, polilla de la punta del pino europeo, polilla gitana (adultos y larvas), polilla India de la harina y polilla de la harina mediterránea), moscas del hongo, polilla del hocico, psylla de pera, chinches de las plantas, psílidos, bichos de la rosa, insectos escama, pececillo de plata, hesperílidos, cochinillas de humedad, chinches, chinche de la calabaza, chinche olorosa, insecto empañado, trips incluyendo los trips de invernadero, moscas del vinagre, gusano de la telaraña, gorgojos (incluyendo el gorgojo del algodón, el gorgojo de la zanahoria, el gorgojo del trébol y el gorgojo del arroz), moscas blancas.

Rociar bien todas las áreas de la planta, especialmente los brotes nuevos y debajo de las hojas. Las plagas deben estar en contacto con el rocío para poder controlarlas.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA

Almacenar a temperatura ambiente y protegido del congelamiento.

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL

CONTENEDOR

No rellenable. No rellenar o volver a usar este contenedor.

Si está vacío:

- Colocar en la basura u ofrecer para su reciclado si fuese posible.

Si está parcialmente lleno:

- Llamar a la agencia de eliminación de desechos sólidos para conocer las indicaciones de eliminación.
- Nunca colocar el producto sin usar en un drenaje de salida o de entrada.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS

- Mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente y cuidadosamente con agua durante 15 o 20 minutos.
- Quitar los lentes de contacto, si los tuviera, luego de los primeros 5 minutos, continuar lavando.
- Llamar al centro de control de envenenamiento o al médico para asesoramiento sobre el tratamiento.

SI ENTRA EN CONTACTO CON PIEL O ROPA

- Quitar inmediatamente la ropa contaminada.
- Lavar la piel inmediatamente con mucha agua durante 15-20 minutos.
- Llamar al centro de control de envenenamiento o al médico para asesoramiento sobre el tratamiento.

Tenga el contenedor o la etiqueta del producto con usted cuando llame al centro de control de envenenamiento o al médico, o cuando vaya para recibir tratamiento.

Puede llamar gratuitamente al 877-229-3763 para información sobre atención médica de urgencia.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN **Riesgos Para Seres Humanos O Animales Domésticos** **PRECAUCIÓN**

- Causa irritación moderada en los ojos.
- Evitar contacto con los ojos.
- Evitar contacto con la piel o ropa.
- Lavar cuidadosamente con agua y jabón luego de manipularlo y antes de comer, beber, masticar goma de mascar, usar tabaco o ir al baño.

RIESGOS AMBIENTALES


Este producto es tóxico a los organismos acuáticos, incluyendo peces e invertebrados. Para proteger al medio ambiente, no permita que el pesticida ingrese o corra por los drenajes de tormenta, drenaje de aguas pluviales, canaletas o aguas superficiales. Aplique este producto en clima calmo cuando no haya pronóstico de lluvia en las próximas 24 horas para asegurar que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticida fuera del área de tratamiento.

Este producto es altamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo en plantas con flores o malezas. No aplicar este producto o permitir que se escurra por malezas o cultivos por nacer mientras las abejas visitan esta área de tratamiento.

RIESGOS QUÍMICOS O FÍSICOS

Combustible. No usar o almacenar cerca del calor o la llama abierta.

NOTA PARA EL COMPRADOR: Hasta donde lo permita la ley, el vendedor garantiza que este producto corresponde con la descripción química que aparece en la etiqueta y que se adapta a los fines establecidos en esta etiqueta solamente cuando se usa de acuerdo a las instrucciones bajo condiciones de uso normal. Esta garantía no aplica si este producto no se usa de acuerdo a las indicaciones o bajo condiciones de uso normal, o bajo condiciones no razonablemente predecibles para el vendedor. El comprador asume todos los riesgos de tal uso. Hasta donde lo permita la ley, el vendedor no garantiza otras cosas, ya sean expresas o implícitas.



BIOADVANCED®
SCIENCE-BASED SOLUTIONS

FRUIT & VEGETABLE 3-IN-1 SOLUTION CONCENTRATE

FIRST AID

IF IN EYES

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF ON SKIN OR CLOTHING

- Take off contaminated clothing.
- Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.

You may call toll-free (877) 229-3763 for medical emergency information.

PRECAUTIONARY STATEMENTS Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION

- Causes moderate eye irritation.
- Avoid contact with eyes.
- Avoid contact with skin or clothing.
- Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is toxic to aquatic organisms, including fish and invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.

This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds while bees are actively visiting the treatment area.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Combustible. Do not use or store near heat or open flame.

NOTICE TO BUYER: To the extent consistent with applicable law, seller warrants that this product conforms to the chemical description on this label and is reasonably fit for the purposes stated on this label only when used in accordance with directions under normal use conditions. This warranty does not extend to use of this product contrary to label directions, or under abnormal use conditions, or under conditions not reasonably foreseeable to seller. Buyer assumes all risk of any such use. To the extent consistent with applicable law, seller makes no other warranties, either express or implied.

Money Back Guarantee: If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

EPA Reg. No. 67702-17-92564

EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.
(65) = 92564-TX-1 (68) = 67572-GA-1 (39) = 58996-MO-1 (57) = 071106-GA-003



Sold under License of W. Neudorff GmbH KG

BioAdvanced® is a registered trademark
of SBM Life Science Corp.

Distributed by:
SBM Life Science Corp.
1001 Winstead Drive,
Suite 500
Cary, NC 27513

PRESS TO RESEAL

01a 0011